

# Reiseimpfungen

Wir empfehlen, vor Antritt einer Reise rechtzeitig eine individuelle Beratung in Anspruch zu nehmen. (Impfempfehlungen variieren je nach Reisedestination, Reisedauer, Reisedstil etc.)

- Überprüfung/Aktualisierung der altersgemäßen Standardimpfungen

## Reiseimpfungen je nach Zielland und Reiseroute

- Hepatitis A
- Tollwut
- Typhus
- Japanische Enzephalitis
- Meningokokken
- Gelbfieber
- Dengue
- Cholera



Team der Spezialambulanz



Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin  
Medizinische Universität Wien  
Kinderspitalgasse 15  
Erdgeschoß rechts  
1090 Wien


### Kontakt

Medizinische Universität Wien  
Spezialambulanz für Impfungen, Reise- und Tropenmedizin  
Ärztliche Leitung:  
Ursula Wiedermann-Schmidt  
Kinderspitalgasse 15  
1090 Wien

Tel.: +43 (0)1 40160 – 38280  
Fax: +43 (0)1 40160 – 938280  
Isptm-impfungen@meduniwien.ac.at  
pii.meduniwien.ac.at/impfambulanz

Öffnungszeiten  
Mo: 8:30 – 14:00 Uhr, Di bis Fr: 8:30 – 12:00 Uhr

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Rektor Markus Müller, Medizinische Universität Wien. Für den Inhalt verantwortlich: Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin: Ursula Wiedermann-Schmidt. Fotocredits: Cover: MedUni Wien/Houdek, shutterstock.com(3), Gruppenbild: Peter Provaznik. Stand: Mai 2024



**Geimpft –  
Geschützt –  
Sicher!**

Empfohlene Impfungen laut  
Österreichischem Impfplan

[pii.meduniwien.ac.at/impfambulanz](http://pii.meduniwien.ac.at/impfambulanz)

# Säuglinge und Kleinkinder

## Kostenfrei

- **Rotavirus**  
ab der 7. Woche 2-3 Impfungen (impfstoffabhängig)  
Im Abstand von mind. 4 Wochen bis zum vollendeten 6. Monat
- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae B, Hepatitis B** (6-fach-Impfung)  
2+1 Schema (3./5./11.-12. Lebensmonat)
- **Pneumokokken**  
2+1 Schema PNC15 - 15-valenter konjugierter Impfstoff (3./5./12.-14. Lebensmonat),  
(abweichendes Schema bei Hochrisikopersonen)
- **Influenza**  
jährlich ab dem 7. Lebensmonat, bei Erstimpfung 2 Impfungen im Abstand von mind. 4 Wochen (bis zum vollendeten 9. Lebensjahr)
- **Masern-Mumps-Röteln**  
2 Impfungen im Mindestabstand von 3 Monaten ab dem vollendeten 9. Lebensmonat (4 Wochen bei Impfbeginn ab dem ersten Geburtstag)

## Nicht kostenfrei

- **Meningokokken B**  
altersabhängiges 2+1 Impfschema für Säuglinge und Kleinkinder: bis 5 Monate: 2+1: 3./5./12.-15. Lebensmonat; bis 11 Monate: 2+1: mind. 2 Monate zwischen 1., 2. und 3. Dosis; bis 23 Monate: mind. 2 Monate zwischen 1. und 2. Dosis und 12-23 Monate zwischen 2. und 3. Dosis. Ab 2 Jahren: 2 Dosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- **Meningokokken ACWY**  
einmalige Impfung ab dem 13. Lebensmonat
- **Varizellen**  
2 Impfungen im Abstand von mind. (4)-6 Wochen ab dem 13. Lebensmonat
- **FSME**  
2+1 Schema ab dem 13. Lebensmonat: 2. Dosis nach 1-3 Monaten, 3. Dosis 5/9-12 Monate nach der 2. Dosis (impfstoffabhängig), 1. Auffrischung nach 3 Jahren, danach alle 5 Jahre

# Schulkinder

## Kostenfrei

- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis** (4-fach-Impfstoff) – Auffrischung ab 6 Jahren
- **Hepatitis B**  
Auffrischung, ab dem 7. Lebensjahr (oder Nachholen der Grundimmunisierung 0-1-6 Monate)
- **Humane Papillomaviren (HPV)**  
ab dem 10. Lebensjahr, kostenfrei bis zum 21. Geburtstag: 2 Dosen im Abstand von 6-12 Monaten
- **Meningokokken ACWY**  
einmalige Impfung zwischen 11. und 13. Lebensjahr
- **COVID-19**  
ab dem vollendeten 12. Lebensjahr einmalige Impfung alle (6)-12 Monate (Grundimmunisierung bei Personen ohne vorherige Exposition) möglich
- **Influenza** – jährlich
- **Masern-Mumps-Röteln**  
bei Ungeimpften oder Nicht-immunen: Impfung nachholen (2x)

## Nicht kostenfrei

- **Varizellen**  
Nachholimpfung bei Ungeimpften oder Nicht-immunen (2x)
- **FSME**  
Auffrischung alle 5 Jahre

# Erwachsene

## Kostenfrei / öffentliches Impfprogramm

- **Masern-Mumps-Röteln**  
bei Ungeimpften oder Nicht-immunen: Impfung nachholen (2x)
- **Influenza** – jährlich
- **COVID-19**  
einmalige Impfung alle 12 Monate möglich

## Nicht kostenfrei

- **Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis** (4-fach-Impfstoff) – Auffrischung alle 10 Jahre bis zum vollendeten 60. Lebensjahr, danach alle 5 Jahre
- **FSME**  
Auffrischung bis zum vollendeten 60. Lebensjahr alle 5 Jahre, danach alle 3 Jahre
- **Hepatitis B** – gegebenenfalls nachholen
- **Humane Papillomaviren (HPV)**  
gegebenenfalls nachholen, ab 21 Jahren 3 Impfungen (0/2/6-8 Monate)
- **Varizellen**  
Nachholimpfung bei Ungeimpften oder Nicht-immunen (2x)
- **Herpes Zoster** (inaktivierter Impfstoff)  
ab 50 Jahren, 2 Dosen im Abstand von 2-6 Monaten (abweichende Empfehlung für Hochrisikopersonen)

# Senioren > 60 Jahre

## Besonders wichtige Impfungen

- **Pneumokokken**  
PNC (20-valenter konjugierter Impfstoff), nach einem Jahr 23-valenter Polysaccharidimpfstoff (abweichendes Schema bei Hochrisikopersonen alle 6 Jahre)
- **Herpes Zoster** (siehe oben)
- **RSV**  
einmalig für 2 Saisonen
- **Influenza** – jährlich
- **COVID-19**  
alle (6)-12 Monate

